

## 斜視手術(片眼)(前日入院)を受けられる (

) さま

 主 治 医 は、
 です

 病 棟 師 長 は、
 です

 担当看護師は、
 です

|         | 入院当日                        | (手術)入院2日目  | 入院3日目(退院日)  |
|---------|-----------------------------|--|---|
| 月・日・曜日  | / ( )                       | / ( )  | / ( )   |
| 食事・栄養   | 昼食より出ます                     |  |   |
| 安静度     |                             | 手術後、トイレ歩行可能です<br>(手術後、1回看護師と一緒に歩きます)   |   |
| 保 清     |                             | 眼鏡・指輪・時計・ネックレス・化粧・マニキュアはしないでください<br>午前中は入浴できます<br>手術後は、洗髪・洗顔はできません   | 退院後は洗髪・洗顔・入浴・歯みがき・ひげそりができます   |
| ( )眼点 眼 |                             |  | 起床時に看護師が眼帯除去し、レボフロキサシン点眼をします<br>手術翌日からはレボフロキサシン点眼、<br>ベロベゾロン点眼(朝・昼・夕・就寝前に点眼します) |
|         | 術後ふき綿を使用します(東棟1階の売店で購入できます) | 手術室からの連絡を受け、看護師が点眼を始めます  | オフロキシン眼軟膏を就寝前に点入します   |
| 服薬∙注射   | 内服薬の確認をしますので、看護師にお知らせください   | 点眼開始時に筋肉注射をします   |   |
|         | 手術前から内服している薬剤は、継続して内服してください | 手術が終了し病室に戻ったら鎮痛剤を1錠内服します   | 朝から抗生剤と鎮痛剤を内服します(3日間)   |
| 眼带      |                             | 手術後から翌朝まで眼帯を装着します  | 起床後、看護師が眼帯を外します   |
| 診察(外来)  | 午後(外来)                      |  | 8:20(眼科外来):診察   |
|         | 看護師による説明                    | 手術はあおむけで行います。頭を動かさないようにしましょう  〈手術中の注意点〉 急に動くと危険です。 痛いとき、咳をしたいとき、くしゃみがでそうなとき、トイレに行きたいときなどは、顔を動かさずに言葉で教えて下さい | ご不明な点があれば外来看護師におたずね下さい  |

